

家庭園芸用肥料

カズサP&K

すくすく育つ酸素供給！

酸素の力で野菜に活力を与える！



商品名	容量	JANコード
カズサP&K	10kg	4987702616707

カズサP&K

作物のこんな症状に・・・

肥料の吸収を良くしたい
(液肥を与える当日~3日前)

栽培期間が高湿期や
低湿期にかかる

成り疲れの症状

根が弱っている

湿害を受けた

特徴

- カズサP&Kは土中の重金属や有機物と反応し酸素を放出したのち水が残る安全・安心な肥料です。
- カズサP&K(10kg)は即効性の酸素を200L放出します。
- 土の中で分解しますので土の中を好気性にします。
- 根の呼吸を助けて根の張りを旺盛にします。

使用例

種類	品種	使用方法
果菜類	キュウリ、イチゴ、トマト、ナス、メロン、ピーマン、スイカなど	育苗時：100倍希釈液を灌水時に施用する。 定植時：100倍液に苗をドブ漬け又は灌水する。 定植後：灌水100倍液以上に希釈して1000L/10a 側面散布：100倍液を200L~400L/10a
葉菜類	レタス、キャベツ、ハクサイ、ほうれん草、大葉、小松菜、春菊など	葉面散布：100倍液を200L/10a 灌水：100倍以上に希釈し、株元へ灌水する。 ※ニラ：収穫直後に100倍液を散布する。
根茎類	大根、さつまいも、人参、玉ねぎ、ネギ、アスパラガス、セロリ、ニラなど	葉面散布：100倍液を200L/10a 灌水：100倍以上に希釈し、株元へ灌水する。 ※ニラ：収穫直後に100倍液を散布する。
花卉類	菊、バラ、カーネーション、シクラメン、ラン、トルコギキョウなど	※ベッド栽培 定植時：100倍液を散布又は灌水する。 定植後：1~2週間ごとに灌水する。 ※鉢栽培：植替前後に100倍液を散布又は灌水する。
水稻		種粒浸漬時：50倍液で72時間浸漬する。 育苗時：100倍液を育苗時箱に500cc灌水する。 出穗時：出穗20日前から2L~3L/10aを10日毎に4回流し込む。

警告

GHS
ラベル



呼吸器感作性



急性毒性(低毒性)

使用上の注意

- カズサP&Kとアルカリ性の強い薬剤、あるいは鉄剤との混用は避けてください。
- 石灰硫黄混合剤と混合すると有害ガスが発生する恐れがあり、危険ですから混用は避けてください。



保護メガネ着用



保護手袋着用



子供注意

【成分】

水溶性リン酸 0.1%
水溶性カリウム 0.1%

【安全対策】

- 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。(P202)
- 可燃物から遠ざけること。(P220)
- 容器を密閉しておくこと。(P233)
- 指定された個人用保護具を使用すること。(P281)
- 熱から遠ざけること。(P210)
- 取扱後は良く手を洗うこと。(P264)
- ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。(P260)

【応急措置】

- 皮膚又は毛に付着した場合は直ちに汚染された衣類を全て脱ぎ又は取り除くこと。皮膚を流水又はシャワーで洗うこと。(P303+P361+P353)
- 汚染された衣類を再使用する場合、再使用する前に洗濯すること。(P363)
- 吸入した場合、被災者を新鮮な空気のある場所に移動し呼吸しやすい姿勢で休息させること。(P363)
- 吸入した場合、直ちに医師に連絡すること。(P310)
- 火災の場合には適切な消火剤を使用すること。(P370+P378)
- 飲み込んだ場合、口をすぐすこと。無理に吐かせないこと。(P301+P330+P331)
- 飲み込んだ場合、気分が悪いときは、医師に連絡すること。(P301+P312)
- 目に入った場合、水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に取り外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。(P305+P351+P338)
- 眼に入った場合、直ちに医師に連絡すること。(P310)

【保管】

- 容器を密閉して換気の良い場所で保管すること。(F103+P233)
- 日光から遮断すること。(P410)

【廃棄】

- 内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の産業廃棄物処理業者に廃棄委託すること。(P501)

製造販売者



株式会社 カズサ



チーハくん
千葉県承認第A2065-1号



〒299-4205 千葉県長生郡白子町南日当2424-6

商品お問合せ先

TEL 0475-33-6417

<http://www.kazusa1986.co.jp>

取扱店